

Atlas

Insetticida piretroide ad ampio spettro di azione
in formulazione microincapsulata

Composizione: Lambda cialotrina 9,4 gr (=100 gr/l)

Formulazione: Sospensione in microcapsule (CS)



NOCIVO



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Classificazione DPD:



ATTENZIONE

Classificazione CLP:

Registrazione: n° 15433 del 22/06/2012

Packaging: flacone 0,5 L - cartone 12x0,5 L - pallet 510 L



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Il prodotto si impiega ai primi attacchi, quando le foglie non sono accartocciate e in assenza di melata. Effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata. E' importante assicurare una uniforme copertura della vegetazione da proteggere e favorire il contatto del prodotto con i parassiti; perciò impiegare i volumi maggiori in presenza sia di vegetazione fitta sia di piante di grande sviluppo.

VANTAGGI

- E' dotato di un ampio spettro d'azione ed è efficace sugli insetti nei diversi stadi di sviluppo: uova mature, larve e adulti.
- Attivo essenzialmente per contatto e secondariamente per ingestione.
- La formulazione microincapsulata assicura elevata efficacia e persistenza garantendo massima sicurezza per l'utilizzatore.




SAPEC
AGROITALIA

EPOCA E MODALITA' DI IMPIEGO

COLTURA	FITOFAGO	DOSE (ml/ha)	INDICAZIONI	
Pomodoro	Lepidotteri	150-200	Intervenire con 1-3 trattamenti intervallando di 14 giorni.	
	Afidi	100-150	Intervenire con 1-2 trattamenti intervallando di 14 giorni.	
	Nottue defogliatrici	100-125	Intervenire con 1 trattamento	
Zucchini	Afidi	100-150		
Lattuga		100-150	Intervenire con 1-2 trattamenti intervallando di 14 giorni.	
Cavolfiore Cavolo broccolo Cavolo cappuccio Cavolini di Bruxelles	Lepidotteri	150-200	Intervenire con 1 trattamento	
	Afidi	100-150		
		Nottue defogliatrici	100-125	Intervenire con 1-2 trattamenti
Melo Pero	Afidi	150-200	Intervenire con 1 trattamento	
	Carpocapsa	150-250	Intervenire con 1-2 trattamenti intervallando di 14 giorni.	
	Psilla del pero	200-250		
Pesco Albicocco Nettarine	Afidi	100-150	Intervenire con 1 trattamento	
	Mosca della frutta	150-250		
Nocciolo	Balanino	200-250		
Patata	Dorifora	150-200	Intervenire con 1-2 trattamenti intervallando di 14 giorni.	
	Nottue defogliatrici	100-125	Intervenire con 1 trattamento	
Vite	Tignola e Tignoletta	150-250		
	Cicaline	150-250		
Mais	Piralide	200-250		
	Afidi	150-200		
	Nottue	100-125		
Avena	Afidi	150-200		
Frumento				
Orzo				

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta su avena, frumento e riso, 28 giorni su mais, 21 giorni su vite, 15 giorni su patata, 7 giorni su lattuga, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles, melo, pera, pesco, albicocco, nettarine, nocciolo, 3 giorni su pomodoro e zucchini.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.



Afidi



Nottue



Dorifora della patata