

Azupec 80 WG®

Fungicida Antioidico a base di Zolfo

Composizione: Zolfo 80%

Formulazione: Microgranuli idrodispersibili (WG)

Classificazione DPD:



IRRITANTE

Classificazione CLP:



ATTENZIONE

Registrazione: n° 12949 del 28/05/2009

Packaging: sacchetto 1 kg – cartone 18x1 kg – pallet 720 kg

sacco 5 kg – pallet 500 kg

sacco 25 kg – pallet 1000 kg




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Indicato per il controllo di tutte le forme di Oidio o Mal Bianco.
- Azione collaterale di contenimento nei confronti di Ticchiolatura, Ruggini, Corineo, Escoriosi, Lebbra, Molinosi.
- Azione collaterale di contenimento dei confronti di Acari in genere e in particolare gli Eriofidi.

VANTAGGI

- Zolfo a bassissimo tenore di selenio, selettivo nei confronti delle principali colture anche ad alti dosaggi.
- Microgranulo idrodispersibile ad elevatissima solubilità, indicato anche in caso di miscele complesse con altri agrofarmaci o applicazioni a basso volume.
- Ammesso in agricoltura Biologica.



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURE	AVVERSITA'	DOSI E MODALITA' APPLICATIVE
Vite	Oidio, Necrosi e carie del legno.	<p>Interventi alla dose di 250 – 350 g/hl preventivamente o alla comparsa dei primi sintomi e ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni.</p> <p>Nel periodo estivo trattare soltanto durante le ore più fresche della giornata alle dosi minime consigliate.</p> <p>Con temperature fresche, in casi di necessità e alta pressione della malattia, per una migliore azione eradicante e persistenza innalzare le dosi anche a 400-500 g/hl. Su pisello, cocomero, cetriolo, zucca non superare comunque 200 g/hl.</p> <p>Intervenire alla comparsa dei primi sintomi della malattia sulle foglie apicali alla dose di 7-8 kg per ettaro. Su barbabietola eseguire un secondo intervento dopo 20 gg.</p>
Pomacee	Ticchiolatura, Oidio, Necrosi e carie del legno	
Agrumi		
Drupacee	Ticchiolatura, Corineo, Oidio, Necrosi e carie del legno	
Ortaggi	Oidio, Ruggini, Ticchiolatura	
Fragola		
Olivo	Occhio di pavone, Fumaggine, Ruggine, Oidio	
Nocciolo	Oidio, Ruggini, Necrosi e carie del legno	
Patata, Pomodoro	Oidio, Ruggini, Ticchiolatura	
Girasole, Soia, Tabacco	Oidio	
Floreali e ornamentali, Forestali, Vivai di pioppo	Oidio, Necrosi	
Cereali, Barbabietola da zucchero	Oidio, Ruggini	

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta su tutte le colture.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- Compatibile con i più comuni antiparassitari ad esclusione di quelli a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese, ecc.), olii minerali e formulati a base di Captano.
- Risultano sensibili all'azione dello zolfo alcune varietà di melo (Black Ben Davis, Black Stayman, Calvillia bianca, Commercio, Golden Delicious, Imperatore, Jonathan, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Stayman Winesap), di pero (Buona Luisa d'Avranches, Contessa di Parigi, Decana del Comizio, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William), di pesco e quasi tutte le varietà di albicocco.



Oidio della Vite



Ticchiolatura del Melo



Oidio del Pomodoro