

Deltasap

Insetticida piretroide ad ampio spettro,
concentrato emulsionabile

Composizione: Deltametrina 2,8 gr (=25 gr/l)
Formulazione: Concentrato emulsionabile (EC)



Classificazione DPD: NOCIVO PERICOLOSO PER L'AMBIENTE



Classificazione CLP:

Registrazione: n° 15402 del 10/05/2012

Packaging: flacone 1 L - cartone 12x1 L - pallet 600 L



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- E' dotato di un ampio spettro d'azione, sia su forme giovanili sia su adulti.
- In particolare, ne è indicato l'impiego contro: afidi, aleurodidi, carpocapsa, cavolaia, cocciniglia mezzo grano di pepe, dorifora, microlepidotteri, mosca della frutta e degli agrumi, nottue, piralide, psilla, ricamatrici, tentredini, tignole, tortricidi, tripidi ed altri insetti.

VANTAGGI

- Elevato potere abbattente,
- Breve tempo di carenza
- Massima selettività per la coltura



EPOCA E MODALITA' DI IMPIEGO

COLTURA	FITOFAGO	DOSE (ml/hl)
Melo	Psilla	75
Pero	Afide verde del melo Afide del pesco Cydia pomonella	30-50
Pesco		
Albicocco		
Susino		
Ciliegio		
Vite	Tignola	40-60
	Cicaline	30-50
Olivo	Tignola	40-60
	Mosca delle olive	
Cavolo	Lepidotteri	30-50
Lattuga	Cavolaia	
Zucchini	Nottue	
Pomodoro	Afidi	50
Patata	Dorifora della patata	30-50
Mais	Nottue	Trattamenti primaverili - estivi 30 ml/hl
	Piralide	
	Diabrotica	Trattamenti primaverili - estivi 50 ml/hl
Cereali	Lepidotteri	Trattamenti primaverili - estivi 30 ml/hl
	Afidi	
Nocciolo	Afidi	50
Culture ornamentali in campo		

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta su cereali (escluso il mais), 7 giorni prima della raccolta su olive, patata, melo, pero, e brassicacee (cavoli), 3 giorni prima sulle altre colture.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.



Afidi



Nottue



Dorifora della patata