

Hereu SC®

Erbicida selettivo per Pomacee, Drupacee, Arancio, Limone, Pompelmo, Vite, Nocciolo, Mandorlo, Olivo, Girasole, Carciofo, Vivai forestali e ornamentali, incolti e sedi ferroviarie.

Composizione: Oxyfluorfen 42,9 gr (=500 gr/l)

Formulazione: Sospensione concentrata (SC)



Classificazione DPD: IRRITANTE PERICOLOSO PER L'AMBIENTE



Classificazione CLP: PERICOLO

Registrazione: n° 16033 del 04/06/2014

Packaging: flacone 1 L - cartone 12x1 L – pallet 600 L
tanica 10 L – pallet 500 L



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Controlla un ampio spettro di infestanti annuali, sia graminacee che dicotiledoni, sia in pre che in post emergenza
- Hereu SC® forma una barriera impedendo la nascita delle infestanti

VANTAGGI

- Hereu SC® è una soluzione di riferimento nel controllo delle infestanti del girasole in pre emergenza
- Hereu SC® è il diserbante ideale nella miscelazione con Montana per il controllo totale di un ampio spettro di infestanti sulle aree non coltivate.
- Grazie all'elevata concentrazione di principio attivo Hereu SC® è una soluzione pratica anche nelle aziende di maggiori dimensioni.

INFESTANTI CONTROLLATE

Fra le **graminacee controlla**: Avena (*Avena* spp.), Coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), Giavone (*Echinochloa* spp.), Loglio (*Lolium* spp.), Pabbio (*Setaria* spp.), Poa (*Poa annua*), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*).



INFESTANTI CONTROLLATE (Continuazione)

Fra le dicotiledoni controlla: Acetosella (*Oxalis* spp.), Amaranto (*Amaranthus* spp.), Anagallide (*Anagallis arvensis*), Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), Centocchio comune (*Stellaria media*), Convolvolo nero (*Fallopia convolvulus*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Crisantemo (*Chrysanthemum* spp.), Erba morella (*Solanum nigrum*), Farinello (*Chenopodium album*), Fiorancio (*Calendula arvensis*), Galinsoga comune (*Galinsoga perviflora*), Grespino dei campi (*Sonchus arvensis*), Mercorella comune (*Mercurialis annua*), Ortica (*Urtica* spp.), Papavero (*Papaver* spp.), Persicaria (*Polygonum persicaria*), Persicaria maggiore (*Polygonum lapathifolium*), Porcellana (*Portulaca oleracea*), Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Senecione (*Senecio vulgaris*), Stramonio comune (*Datura stramonio*), Stregona annuale (*Stachys annua*), Veronica (*Veronica* spp.), Visnaga maggiore (*Ammi majus*).

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	DOSE (l/ha)	INDICAZIONI
Pomacee	1-1,35	Pre-emergenza delle infestanti: contro infestazioni composte prevalentemente da specie annuali. Post-emergenza delle infestanti: vedere etichetta per gli specifici casi.
Drupacee		
Arancio		
Limone		
Pompelmo		
Vite		
Nocciolo		
Mandorlo		
Olivo	1-1,35	Intervenire fino ad una settimana prima della raccolta su infestanti sviluppate o in fase di ricaccio dopo lo sfalcio. Solo in caso di forte infestazione la dose può essere elevata a 1,5 lt/ha di superficie effettivamente trattata.
Girasole	0,5	Impiegare su colture seminate ad almeno 70-75 cm di larghezza con applicazioni in bande di 25-30 cm di larghezza. Impiegare HEREU SC® in pre-emergenza della coltura.
Carciofo	0,5-1	Il prodotto deve essere impiegato lungo la fila della coltura su una banda di 25-30 cm di larghezza. In pre-emergenza della coltura 0,5-0,75 lt/ha; in post-emergenza della coltura 0,75-1 lt/ha di superficie effettivamente trattata.
Vivai di forestali e ornamentali	1-1,75	Intervenire prima dell'emergenza delle infestanti annuali. Con specie resinose il prodotto può essere distribuito anche sulla vegetazione, prima delle emissioni dei nuovi germogli.
Incolti	2-2,5	
Sedi ferroviarie		

Intervallo di sicurezza: intervenire con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data della raccolta su olivo.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.



Avena sativa



Alopecurus pratensis



Chenopodium