

# Hereu®

Erbicida selettivo ad ampio spettro in emulsione concentrata

Composizione: Oxyfluorfen 22 gr (=240 gr/l)

Formulazione: Concentrato emulsionabile (EC)



Classificazione DPD: NOCIVO PERICOLOSO PER L'AMBIENTE



Classificazione CLP:

PERICOLO

Registrazione: n° 12961 del 26/10/2005

Packaging: flacone 1 L - cartone 12x1 L - pallet 600 L



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Controlla un ampio spettro di infestanti annuali, sia graminacee che dicotiledoni, sia in pre che in post emergenza
- Hereu® forma una barriera impedendo la nascita delle infestanti

## VANTAGGI

- Hereu® è una soluzione di riferimento nel controllo delle infestanti del girasole in pre emergenza
- Hereu® è il diserbante ideale nella miscelazione con Montana per il controllo totale di un ampio spettro di infestanti sulle aree non coltivate.

## INFESTANTI CONTROLLATE

**Fra le graminacee controlla:** Avena (*Avena spp.*), Coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), Giavone (*Echinochloa spp.*), Loglio (*Lolium spp.*), Pabbio (*Setaria spp.*), Poa (*Poa annua*), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*).

**Fra le dicotiledoni controlla:** Acetosella (*Oxalis spp.*), Amaranto (*Amaranthus spp.*), Anagallide (*Anagallis arvensis*), Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), Centocchio comune (*Stellaria media*), Convolvolo nero (*Fallopia convolvulus*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Crisantemo (*Chrysanthemum spp.*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Farinello (*Chenopodium album*), Fiorancio (*Calendula arvensis*), Galinsoga comune (*Galinsoga perviflora*),



**SAPEC**  
AGROITALIA

## INFESTANTI CONTROLLATE (Continuazione)

*Grespino dei campi (Sonchus arvensis), Mercorella comune (Mercurialis annua), Ortica (Urtica spp.), Papavero (Papaver spp), Persicaria (Polygonum persicaria), Persicaria maggiore (Polygonum lapathifolium), Porcellana (Portulaca oleracea), Ravanello selvatico (Raphanus raphanistrum), Senape selvatica (Sinapis arvensis), Senecione (Senecio vulgaris), Stramonio comune (Datura stramonio), Stregona annuale (Stachys annua), Veronica (Veronica spp.), Visnaga maggiore (Ammi majus).*

## EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	DOSE (l/ha)	INDICAZIONI
Vite	3-5	Impiegare esclusivamente in bande sottoschiuma lungo i filari, intervenendo in pre-emergenza delle malerbe del tardo autunno-inizio inverno, su terreno pulito e quando le stesse cominciano a germinare alla dose di litri 3-4 per ettaro di superficie effettivamente trattata.; in post-emergenza delle malerbe ricorrendo a miscele con altri principi attivi, intervenendo quando le malerbe hanno germogli lunghi non meno di 20 cm e sono in attiva crescita alla dose di litri 4-5 per ettaro di superficie effettivamente trattata in miscela con Dalapon litri 1,5 per ettaro.
Pomacee		
Drupacee		
Nocciolo		
Arancio		
Limone		
Pompelmo		
Girasole	1	Impiegare su colture seminate a file almeno di 70-75 cm di larghezza con applicazioni in bande di 25-30 cm di larghezza. Intervenire in pre-emergenza della coltura a 1 lt/ha di superficie effettivamente trattata.
Carciofo	1-3	Il prodotto può essere impiegato solo lungo la fila della coltura su una banda di 25-30 cm di larghezza. In pre-emergenza della coltura, subito dopo l'impianto o la riattivazione della coltura, alla dose di 1-1,5 lt/ha di s. effettivamente trattata; ed in post emergenza della coltura a 2-3 lt/ha di s. effettivamente trattata.
Vivai forestali e ornamentali	5-8	Impiegare il prodotto solo su impianti con file poste ad almeno 1 m di distanza tra le file con applicazioni localizzate lungo le file, in bande di non oltre i 30 cm di larghezza. In pre-emergenza delle infestanti annuali, trattando uniformemente la superficie. Per combattere il Convolvolo fare due trattamenti, il primo ad inizio fioritura ed il secondo su ricacci lunghi 40-50 cm. Sulle essenze resinose distribuire il prodotto sulla vegetazione ma prima della emissione dei nuovi germogli; su Pioppo ed Eucalipto intervenire a fine inverno prima della ripresa vegetativa.

## INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- Compatibilità con Paraquat, Dalapon, Diquat, Glifosate

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.



Avena sativa



Alopecurus pratensis



Chenopodium