


ERBICIDA NON SELETTIVO AD AZIONE DISSECCANTE

REGLONE W agisce per contatto disseccando rapidamente le parti verdi delle infestanti interessate dal trattamento.

Poco sensibile alle condizioni ambientali e non influenzato dalla temperatura, può essere utilizzato sia su terreno bagnato che dopo periodi di prolungata siccità.

ERBICIDA

COMPOSIZIONE

Diquat 17%
(200 g/l)

INDICAZIONI DI PERICOLO

T+ molto tossico
N - pericoloso per l'ambiente

FORMULAZIONE

liquido solubile

NUMERO DI REGISTRAZIONE

0630 del 23.3.76

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

CAMPI DI IMPIEGO	COLTURE	Dosi (l/ha)	EPOCHE D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Diserbo	Vite, agrumi, fruttiferi e altre colture arboree Piazzole di raccolta olivo Spollonatura del vigneto	3,3 - 5	Intervenire con infestanti non molto sviluppate, impiegando basse pressioni di esercizio ed ugelli a ventaglio o a specchio	Sospendere i trattamenti 10 gg prima della raccolta delle patate e 30 gg prima della raccolta delle altre colture
	Preparazione letti di semina o di trapianto Vivai Asparagiaie Lotta contro la cuscuta Diserbo interfilare e interparcellare delle colture industriali, orticole e floreali	2 - 4		
	Erba medica (escluso anno d'impianto)	2,5 - 3,3		
	Mais e semina senza aratura (sod-seeding)	3,3 - 5		
Disseccamenti colture da seme	Erba medica Mais Grano	1,6 - 3,3		
	Disseccamenti	Piante da fibra Culmi patate		

Nelle applicazioni di diserbo si raccomanda di impiegare REGLONE W con un opportuno bagnante non ionico, ad esempio:

- ETRAVON SYNGENTA alla dose di 30-50 ml/hl
- ETRAVON SYNGENTA va aggiunto alle miscele già pronte per l'uso

ACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO:

Trattandosi di un diserbante-disseccante ad azione sulla clorofilla può arrecare danno a tutte le parti verdi o non ancora bene lignificate delle colture erbacee ed arboree.

CONFEZIONI

flaconi da **1 l**
in cartoni da 12 pezzi

taniche da **5 l**
in cartoni da 4 pezzi

