



FRUTTAFLOR® 20-20-20

CONCIME CE
CONCIME NPK CON BORO (B) - FERRO (Fe) - MANGANESE (Mn) - ZINCO (Zn)
OTTENUTO PER MISCELAZIONE
A BASSO TITOLO DI CLORO PER NEBULIZZAZIONE SUL FOGLIAME

- Rivitalizza la fertilità nei terreni molto sfruttati e "stanchi".
- Crea condizioni sfavorevoli per la diffusione di una ampia serie di funghi e batteri capaci di nuocere allo sviluppo delle piante.
- Efficace nelle fasi giovanili o di crescita delle colture.



Applicazione
sulla pianta

2
kg/Ha

Dose media
d'impiego

CARATTERISTICHE

FRUTTAFLOR® 20-20-20 è un concime specifico per applicazioni fogliari utilizzabile durante tutte le fasi del ciclo colturale. Grazie alla elevata purezza delle materie prime risulta altamente solubile e totalmente assimilabile dalle piante. È caratterizzato da un rapporto NPK (1-1-1) per consentire un equilibrato sviluppo vegeto-produttivo e migliorare le caratteristiche di frutta, ortaggi e floricole. Arricchito con microelementi chelati per prevenire manifestazioni carenziali che potrebbero compromettere il raccolto.



COMPOSIZIONE

AZOTO (N) ORGANICO Totale di cui: Azoto nitrico 6,0% - Azoto ammoniacale 4,0% - Azoto ureico 10,0%	20,0%
ANIDRIDE FOSFORICA (P ₂ O ₅) solubile in citrato ammonico neutro e acqua	20,0%
OSSIDO DI POTASSIO (K ₂ O) solubile in acqua	20,0%
BORO (B) solubile in acqua	0,01%
FERRO (Fe) chelato con EDTA	0,2%
MANGANESE (Mn) chelato con EDTA	0,1%
ZINCO (Zn) chelato con EDTA	0,01%

Ferro, Manganese e Zinco sono chelati con EDTA (Acido Etilendiamminotetracetico). I chelati di EDTA sono stabili ai seguenti intervalli di pH: Fe EDTA 4-7; Mn EDTA 6-10; Zn EDTA 6,5-10.



FORMULAZIONE

Polvere solubile



CONFEZIONI

Sacchetto: kg 2



MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Leggere l'etichetta prima dell'uso.



COLTURE



PERIODO APPLICAZIONE



DOSE

VITE DA VINO	Da pre-fioritura alla raccolta.
VITE DA TAVOLA	Da fine allegagione a raccolta.
MELO E PERO	Da caduta petali a invaiatura.
ACTINIDIA	Da post-fioritura alla raccolta.
AGRUMI	Da allegagione alla raccolta.
OLIVO	Da pre-fioritura alla raccolta.
FRAGOLA	Da pre-fioritura alla raccolta.
POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, CETRIOLO, ZUCCHINO	Da inizio allegagione alla raccolta.
MELONE, COCOMERO	Da pre-fioritura alla raccolta.
PATATA	Da post-fioritura a raccolta.
ORTAGGI A FOGLIA	A partire dalle prime fasi di sviluppo.
ORTAGGI IN GENERE	Dalle prime fasi alla raccolta.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, COLTURE INDUSTRIALI E DA SEME	Da pieno sviluppo fogliare a raccolta.
FLORICOLE E ORNAMENTALI	Applicazioni ripetute durante la fase vegetativa. Non trattare con petali visibili.
TAPPETI ERBOSI	applicare periodicamente da marzo all'autunno.

TRATTAMENTI FOGLIARI:
dose di 200-250 g/hl, ogni 10-15 giorni.
Il dosaggio è riferito per volumi d'acqua cosiddetti "normali" di 1000 litri/Ha.
Sono consigliati 2-4 interventi durante il ciclo, da modulare e/o aumentare con sviluppi e/o andamento stagionale avverso.
Intervenire nelle ore fresche.
In abbinamento al diserbo con le microdosi (MDR) non superare 0.5 kg/Ha.
Utilizzare dosaggi minori del 30% per le colture sotto serra o tunnel.