

SUMITOMO CHEMICAL

Creative Hybrid Chemistry
For a Better Tomorrow

DIFESA
Macciola

STRATEGIA
PER LA DIFESA INTEGRATA

Siapa

PRODOTTO	BIO	REGISTRAZIONE	FORM.	DOSE	COMPOSIZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP	T. CARENZA
ANTAL		N. 15536 del 20-01-2014	EC	30 ml/hl (420-500 ml/ha)	Deltametrina pura 2,8 g (=25 g/l)	PERICOLO H226, H302, H304, H315, H318, H336, H410, EUH401	30 giorni
KAIMO SORBIE		N. 15052 del 28-10-2011	EG	150-300 g/ha, 20-30 g/hl	Lambda-cialotrina pura 5 g (5%)	ATTENZIONE H302, H320, H410, EUH401	14 giorni
CHAMP 20 WG		N. 17091 del 07-12-2017	WG	250-280 g/hl (2,5-2,8 kg/ha)	Rame metallo 20 g (sotto forma di idrossido)	PERICOLO H317, H318, H410, EUH401	-
CHAMP DP		N. 11303 del 07-05-2002	WG	125 g/hl (1,5-2 kg/ha)	Rame metallo puro 37,5 g (sotto forma di idrossido)	PERICOLO H302, H315, H318, H410, EUH401	-
CRITTOVIT WG		N. 11497 del 08-11-2002	WG	200-300 g/hl	Zolfo puro (esente da selenio) 80 g	ATTENZIONE H315, EUH401	5 giorni
CYPRUS 25 WG		N. 17090 del 30-10-2017	WG	225-240 g/hl (2,250-2,4 kg/ha)	Rame metallo 25 g (sotto forma di ossicloruro)	ATTENZIONE H319, H410	-
IPERION		N. 10296 del 03-02-2000	WG	200-250 g/hl; 450 g/hl (invernale)	Rame metallo 37,5 g (da ossicloruro tetraramico)	ATTENZIONE H410, EUH401	20 giorni
MYSTIC 430 SC		N. 13120 del 26-08-2009	SC	35 ml/hl (max 525 ml/ha)	Tebuconazolo 430 g/l	ATTENZIONE H302, H361d, H411, EUH208, EUH401	-
PASTA SIAPA F NC		N. 12778 del 19-09-2005	SC	350-400 ml/hl; 450 ml/hl (invernale)	Rame metallo 25 g (377,5 g/l) (da ossicloruro tetraramico)	ATTENZIONE H410, EUH208, EUH401	20 giorni
PASTA SIAPA F BLU		N. 12780 del 19-09-2005	SC	350-400 ml/hl; 450 ml/hl (invernale)	Rame metallo 25 g (377,5 g/l) (da ossicloruro tetraramico)	ATTENZIONE H410, EUH208, EUH401	-
TRI-BASE		N° 14178 del 18-03-2008	SC	3 - 4 l/ha - 250 ml/hl (1200-1600 l/ha)	Rame metallo 14,84% (= 190 g/L) (sotto forma di rame solfato tribasico)	ATTENZIONE H410, EUH208, EUH401	-
FUSILADE MAX		N. 11353 del 05-06-2002	EC	Da 0,75 a 2,00 l/ha	Fluazifop - p - butile puro gr 13,40 (=125 g/l)	ATTENZIONE H361, H411	-
KYLED		N. 15051 del 30-07-2012	SL	6 l/ha (per superficie effettivamente trattata)	Glifosate acido puro (da sale isopropilamminico) 20,7 g (= 240 g/l) 2,4D acido puro 13,8 g (= 160 g/l)	ATTENZIONE H317, H319, H411, EUH401	30 giorni
SILGLIF ST		N. 16794 del 21-07-2016	SL	1,5-12 l/ha	Glifosate acido puro (da sale isopropilamminico) 31,2 g (=360 g/l)	EUH401	-
WEEDMASTER 540		N. 16890 del 27-07-2017	SL	2,6-4 l/ha	Glifosate acido puro g 43,9 (= g/l 540) (equivalenti a 715 g/l sotto forma di sali ammonio e isopropilamminico)	H413, EUH401	21 giorni
ERGOVIT XL		-	SL	70-100 ml/hl	AATC (acido N-acetiltiazolidin-4-carbossilico) 2,5%, ATC (acido tiazolidin-carbossilico) 2,5%	EUH208, EUH210	-
MANNI-PLEX BORO		-	SL	200-300 ml/hl (2-3 l/ha)	Boro (B) solubile in acqua 3,3 % (38,3 g/l)	PERICOLO H360, H360FD	-
MANNI-PLEX CA		-	SL	2-3 l/ha	Azoto (N) nutritivo 8% (115 g/l); Ossido di Calcio (Ca) solubile in acqua 14% (201 g/l)	ATTENZIONE H302	-
MANNI-PLEX K		-	SL	400-600 ml/hl	Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 20% (266 g/l)	PERICOLO H302, H314	-
MANNI-PLEX MULTI MIX		-	SL	200-300 ml/hl	Ferro (Fe) solubile in acqua 2%; Manganese (Mn) solubile in acqua 2%; Zinco (Zn) solubile in acqua 2%	ATTENZIONE H302, H312, H315, H319	-
MYCOAPPLY DR		-	SP	Pre-impianto: 500 g/hl per la bagnatura delle piante. In fertirrigazione: 1,7-2 kg/ha (dose alta alla prima applicazione, dose bassa per il richiamo)	Contenuto in Micorrize (Rhizophagus irregularis - Claroideoglomus luteum - Claroideoglomus claroideum Claroideoglomus etunicatum) e batteri della rizosfera. Propaguli/g: 132	-	-
PUSHY		-	SC	4L/ha per applicazioni fogliari	Azoto (N) organico 3% - Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 4% - Carbonio organico (C) 19%	-	-
SIAPTAN 10 L		-	SL	200-300 ml/hl	Bioestimolante di origine naturale a base di epitelio animale idrolizzato. N: 8,7%; C organico: 25%.	-	-

EC- Concentrato o liquido Emulsionabile
EG- Granuli Emulsionabili idrodispersibili
LE- Liquido Emulsionabile
SC- Sospensione Concentrata

SL- Concentrato Solubile
SP- Polvere Solubile
WG- Granuli disperdibili in acqua
WP- Polvere Bagnabile

Consentito in agricoltura biologica

Siapa

Il posizionamento dei prodotti è da considerarsi indicativo e soggetto ad adattamenti in funzione delle realtà locali. Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute; per relativa composizione e numero di registrazione si rinvia alle schede dei prodotti disponibili anche in internet; usare i prodotti fito-sanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.).

GEMMA D'INVERNO			
FIORITURA MASCHILE E FEMMINILE			
ROTTURA GEMME		BATTERIOSI MAL DELLO STACCO CANCRO RAMEALE	 TRI-BASE[®]  CHAMP[®]  CYPRUS[®] 25 WG
		ERIOFIDE	 Pasta Siapa  Iperion[®]
GERMOGLIAMENTO TERZA FOGLIA		NUTRIZIONE	 Siapton[®]10L o  Pushy[®] + Manni-Plex Boro
		ERIOFIDE	 CRITTOVIT[®] WG
DIFFERENZIAZIONE NOCCIOLA		CIMICI E AGRILO AFIDI	 KAIMO[®] SORBIE o ANTAL[®]
		MARCIUME NECROSI ANTRACNOSI	MYSTIC[™] 430SC
		NUTRIZIONE	Manni-Plex Multi Mix ERGOVIT[®] XL
OVARIO FECONDATO VISIBILE		NUTRIZIONE	 Siapton[®]10L  Pushy[®] + Manni-Plex Ca
ACCRESIMENTO MANDORLA		CIMICI AGRILO AFIDI	 KAIMO[®] SORBIE o ANTAL[®]
		MARCIUME NECROSI ANTRACNOSI	MYSTIC[™] 430SC
		NUTRIZIONE	Manni-Plex Ca ERGOVIT[®] XL
DEFINIZIONE MANDORLA		NUTRIZIONE	Manni-Plex K
POST RACCOLTA			
INIZIO CADUTA FOGLIE		BATTERIOSI MAL DELLO STACCO CANCRO RAMEALE	 TRI-BASE[®]  CHAMP[®]  CYPRUS[®] 25 WG
COMPLETA CADUTA FOGLIE			
INTERVENTO ERBICIDA		SILGLIF[®] ST o FUSILADE[®] MAX o WeedMaster[®] 540	KYLEO[®]
BAGNATURA RADICALE PRE-IMPIANTO		 MycoApply[®] DR	
FERTIRRIGAZIONE			

Alcune immagini sono tratte dalla guida Agrion 2018.

Il posizionamento dei prodotti è da considerarsi indicativo e soggetto ad adattamenti in funzione delle realtà locali. Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute; per relativa composizione e numero di registrazione si rinvia alle schede dei prodotti disponibili anche in internet; usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.).

