

PROGRAMMA NUTRIZIONALE NOCCIOLO



FOGLIARE

FASE FENOLOGICA	FOGLIARE	OBIETTIVO
<p>DA RIPRESA VEGETATIVA A DIFFERENZIAZIONE FRUTTO</p>	<p>ERANTHIS (2 l/ha)</p> <p>in corrispondenza dell'emissione della 3° - 4° foglia (eventuale 2° trattamento dopo 15 - 20 giorni)</p>	<p>Stimolazione dell'attività vegetativa Mitigazione degli stress idrici (WUE) Mitigazione degli stress termici (gelate)</p>
<p>DIFFERENZIAZIONE FRUTTO / ACCRESCIMENTO MANDORLA</p>	<p>ERANTHIS (2 l/ha) + MAGNESIOGREEN ATTIVATO (4 kg/ha)</p> <p>2° trattamento dopo 15 - 20 giorni</p>	<p>Ingrossamento frutto e aumento resa Riduzione della cascola Miglioramento della resa allo sgusciato</p>
<p>POST RACCOLTA / PRE-CADUTA FOGLIE</p>	<p>BOROGREEN L (1 l/ha) + OLIGOGREEN (1 kg/ha)</p>	<p>Aumento delle sostanze di riserva e stimolo alla fioritura ed allegagione Riduzione della cascola florale e post-allegagione</p>