



Area di riferimento: NOLANO

- **Periodo:** 21 luglio - 28 luglio
- **Individui monitorati:** ADULTI (n. medio catture/trappola/settimana)




- **Individui monitorati:** STADI GIOVANILI (n. medio catture /trappola/settimana)



Le catture di individui adulti per l'area NOLANA sono rimaste stabili rispetto a quanto osservato la scorsa settimana con valori pari a 0. Segno che gli individui sono ormai diffusi nelle colture. Il dato è rimasto sostanzialmente stabile anche in relazione alle catture di stadi giovanili che mostrano numero contenuti con circa 5 individui catturati in media per trappola.


Si consiglia il monitoraggio mediante campionamento visivo della vegetazione e dei frutti e mediante "frappage" su colture idonee. La diffusione della cimice asiatica nelle coltivazioni suggerisce un'attenta valutazione della strategia di difesa da attuare.

METEO PREVISTO NELLA SETTIMANA DAL 28 LUGLIO al 4 AGOSTO




Area di riferimento: VISCIANO-MANDAMENTO

- Periodo: 21 luglio - 28 luglio
- Individui monitorati: ADULTI (n. medio catture/trappola/settimana)



- **Individui monitorati: STADI GIOVANILI (n. medio catture /trappola/settimana)**



I dati rilevati per VISCIANO-MANDAMENTO mostrano una ulteriore diminuzione (-40%) delle catture di adulti segno della completa diffusione nelle coltivazioni; i valori sono inferiori ad 1 unità in media catturata per trappola. Si registra una sostanziale stabilità nell'andamento delle catture di stadi giovanili il cui dato rimane cristallizzato intorno alle 8 unità catturate in media per trappola. Il dato del frappage, per questa settimana è pari a 1,66 neanidi catturate in media per pianta e di 1 individuo adulto.

Si consiglia un attento monitoraggio della coltura mediante campionamento della vegetazione o “*frappage*”. La diffusione della cimice asiatica nelle coltivazioni e l’andamento delle catture di stadi giovanili suggeriscono un’attenta valutazione della strategia di difesa da attuare.


METEO PREVISTO NELLA SETTIMANA DAL 28 LUGLIO al 4 AGOSTO

28/07/2025 29/07/2025 30/07/2025 31/07/2025 01/08/2025 02/08/2025 03/08/2025 04/08/2025




Area di riferimento: IRPINIA

- **Periodo:** 21 luglio - 28 luglio
- **Individui monitorati: ADULTI** (n. medio catture/trappola/settimana)



- **Individui monitorati: STADI GIOVANILI** (n. medio catture /trappola/settimana)



L' andamento delle catture di adulti in IRPINIA è diminuito fino a registrare, nel corso della settimana di rilevazione, 0 catture in media per trappola. Gli adulti sono diffusi nelle coltivazioni. Il numero delle catture di stadi giovanili si rivela in lieve, ma non sostanziale aumento, attestandosi di poco sopra e 5 unità in media per trappola.


Si consiglia di effettuare il monitoraggio della vegetazione, mediante campionamento visivo e/o "frappage" su colture idonee e in presenza di frutti suscettibili di danno; La diffusione dell'insetto nelle coltivazioni suggerisce un'attenta valutazione degli interventi di difesa da attuare.

METEO PREVISTO NELLA SETTIMANA DAL 28 LUGLIO al 4 AGOSTO


28/07/2025	29/07/2025	30/07/2025	31/07/2025	01/08/2025	02/08/2025	03/08/2025	04/08/2025
							

Area di riferimento: ALTO CASERTANO

- **Periodo:** 21 luglio - 28 luglio
- **Individui monitorati: ADULTI** (n. medio catture/trappola/settimana)



- **Individui monitorati: STADI GIOVANILI** (n. medio catture /trappola/settimana)



Il numero di adulti campionati nell'ALTO CASERTANO si è ulteriormente ridotto rispetto alla rilevazione precedente con una media individui rilevati per trappola inferiore a 1. Stabile, sostanzialmente, il numero delle catture di stadi giovanili registrate nel corso della settimana di rilevazione con una media di 9 individui per trappola.

Si consiglia il monitoraggio della coltura mediante campionamento della vegetazione o mediante "frappage" in presenza di frutti suscettibili di danno. La diffusione dell'insetto nelle coltivazioni suggerisce un'attenta valutazione degli interventi di difesa da attuare.


METEO PREVISTO NELLA SETTIMANA DAL 28 LUGLIO al 4 AGOSTO

28/07/2025	29/07/2025	30/07/2025	31/07/2025	01/08/2025	02/08/2025	03/08/2025	04/08/2025
							


Area di riferimento: TEANESE

Periodo: 21 luglio - 28 luglio

- Individui monitorati: ADULTI (n. medio catture/trappola/settimana)



- Individui monitorati: STADI GIOVANILI (n. medio catture /trappola/settimana)



Il numero di adulti catturati nel TEANESE continua a registrare valori bassi prossimi a 0 individui per trappola segno che l'insetto è ormai diffuso nelle colture. Rispetto alla settimana precedente, il numero di stadi giovanili catturati segna un lieve aumento (20%). Il dato del frappage ha rilevato un numero pari a 1 individuo adulto e 3,33 individui giovani per pianta.

Si consiglia di continuare il monitoraggio della vegetazione, mediante campionamento visivo e "frappage" su colture idonee e suscettibili di danno. La diffusione dell'insetto nelle coltivazioni suggeriscono un'attenta valutazione degli interventi di difesa da attuare.


METEO PREVISTO NELLA SETTIMANA DAL 28 LUGLIO al 4 AGOSTO

28/07/2025 29/07/2025 30/07/2025 31/07/2025 01/08/2025 02/08/2025 03/08/2025 04/08/2025




Area di riferimento: FALCIANO - CARINOLA

- **Periodo:** 21 luglio - 28 luglio
- **Individui monitorati:** ADULTI (n. medio catture/trappola/settimana)



- Individui monitorati: STADI GIOVANILI (n. medio catture /trappola/settimana)



Nell'area di FALCIANO-CARINOLA il numero delle catture di adulti è ormai cristallizzato sul valore di 0 individui per trappola. Contestualmente si registra un lieve aumento (+7%) del dato delle catture di stadi giovanili segno che ormai l'insetto è diffuso nelle colture.

Si consiglia il monitoraggio mediante campionamento visivo della vegetazione e dei frutti e mediante *"frappage"* su colture suscettibili di danno; data la stabilità del dato delle catture si consiglia di valutare con attenzione le strategie di difesa da intraprendere.


METEO PREVISTO NELLA SETTIMANA DAL 28 LUGLIO al 4 AGOSTO

28/07/2025	29/07/2025	30/07/2025	31/07/2025	01/08/2025	02/08/2025	03/08/2025	04/08/2025
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------




Area di riferimento: TELESINO - TITERNO

- Periodo: 21 luglio - 28 luglio
- Individui monitorati: ADULTI (n. medio catture/trappola/settimana)



- Individui monitorati: STADI GIOVANILI (n. medio catture /trappola/settimana)



Il numero di adulti campionati nel TELESINO_TITERNO risulta pari a 1 cattura in media per trappola in linea con quanto rilevato nelle ultime 3 settimane. Il dato si discosta in diminuzione rispetto a quanto osservato nello stesso periodo dello scorso anno. L'insetto è diffuso nelle colture. Sostanzialmente stabile il numero di catture di stadi giovanili.


Si consiglia il monitoraggio mediante campionamento visivo della vegetazione e dei frutti mediante "frappage" su colture suscettibili di danno; dato il superamento del picco di catture di stadi giovanili si consiglia di valutare con attenzione le strategie di difesa da intraprendere.

METEO PREVISTO NELLA SETTIMANA DAL 28 LUGLIO al 4 AGOSTO


28/07/2025	29/07/2025	30/07/2025	31/07/2025	01/08/2025	02/08/2025	03/08/2025	04/08/2025
							

Area di riferimento: GIFFONESE

- Periodo: 21 luglio - 28 luglio
- Individui monitorati: ADULTI (n. medio catture/trappola/settimana)



- Individui monitorati: STADI GIOVANILI (n. medio catture /trappola/settimana)



In generale nell'area del giffonese i numeri delle catture sia per gli stadi adulti che per quelli giovanili sono al di sotto dei livelli di allerta. Gli stadi adulti catturati sono stabilmente pari a 0 mentre quelli giovanili hanno subito, nel corso dell'ultima settimana di rilevazione, un lieve aumento seppur i numeri delle catture (circa 1 individuo in media per trappola catturato) non desti preoccupazione.

Si consiglia il monitoraggio mediante campionamento visivo della vegetazione e dei frutti e mediante "frappage" su colture idonee, al fine di valutare l'entità della diffusione dell'insetto nelle coltivazioni e definire l'attuazione di eventuali interventi di difesa.

METEO PREVISTO NELLA SETTIMANA DAL 28 LUGLIO al 4 AGOSTO

28/07/2025	29/07/2025	30/07/2025	31/07/2025	01/08/2025	02/08/2025	03/08/2025	04/08/2025
							